

5.4.Разработка и реализация индивидуальных и групповых профилактических и коррекционных оздоровительных программ, в т.ч. профилактика зависимого поведения и социально обусловленных болезней

К социально обусловленным болезням относятся: туберкулез, ВИЧ-инфекция, инфекции передающиеся половым путем.

Заражение туберкулезом очень часто наблюдается в детско-подростковом возрасте. Не каждый зараженный туберкулезом заболевает. Возникновение туберкулеза зависит:

1. от ослабленности организма;
2. условий жизни (недостаточная освещенность солнечным светом и влажность жилища);
3. нерационального и недостаточного питания;
4. пристрастия к табаку и алкоголю;

Если человек здоров, проживает в нормальном жилище, хорошо питается, его иммунная система справляется с палочками туберкулеза.

К специфической профилактике относится введение вакцины БЦЖ при рождении и туберкулинодиагностика, ежегодно проводимая в нашей школе.



Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что с каждым годом охват детей туберкулинодиагностикой повышается в процентном соотношении. Это связано с проводимой в школе санитарно-просветительской работой среди родителей, в первую очередь.

Количество детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, тоже снижается. Можно точно сказать, что на это влияет работа службы здоровья по укреплению здоровья, гигиеническому и физическому воспитанию, а также политика, проводимая Государством по улучшению жилищных условий населения.



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 613 Московского района Санкт-Петербурга.

Учащихся 9, 10, 11 классов приглашают на лекции и осмотры в «Центр по охране репродуктивного здоровья подростков» к гинекологу и андрологу. Врачи-специалисты рассказывают о возрастных изменениях, происходящих в организме, о личной гигиене, о профилактике заболеваний ППП, о мерах предосторожности в неблагоприятных жизненных ситуациях.